LIFE baccata
NATURA 2000

flora asociada

El conjunto de especies vegetales que acompañan a la tejeda varía en función de la comunidad donde está inmersa (bosque mixto de frondosas, robledales, hayedos, pinares, etc.), siendo las especies más frecuentes el acebo *(Ilex aquifolium)*, el avellano *(Corylus avellana)*, el brezo *(Erica arborea)*, el arándano *(Vaccinium myrtillus)*, serbales *(Sorbus aria, S. aucuparia)*, sauce cabruno *(Salix caprea)*, *Daphne laureola, Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, Sanicula europaea*, etc.

En las tejedas también son abundantes los pteridofitos o helechos: *Pteridium aquilinum, Blechnum spicant*, etc.

En cuanto a los líquenes, gran parte de las tejedas de la zona de estudio cuentan con la presencia de especies del género *Lobaria*, considerado como un bioindicador de alta calidad ambiental.

Acebo *(Ilex aquifolium)*

Avellano *(Corylus avellana)*

Lorem ipsum
Roble. Carballo *(Quercus robur)*

Arándano *(Vaccinium myrtillus)*

Serbal de cazadores *(Sorbus aucuparia)*

Torvisco macho, Adelfilla *(Daphne laureola)*

Brezo *(Erica arborea)*

Oxalis acetosella

Sanicula europaea

Helechos *(Blechnum spicant)*

Lobaria pulmonaria

Anemone nemorosa

Haya *(Fagus sylvatica)*

Fotografías: Patricio José Bariego Hernández /Xavier Garcia Martí / Prudencio Fernández González,
Froilán Sevilla Martínez / Socios del proyecto LIFE BACCATA

www.life-baccata.eu

LIFE baccata
NATURA 2000

SOCIOS

LIFE15 NAT/ES/000790

USC Universidade de Santiago de Compostela
Junta de Castilla y León
cesefor
hazi Landa, itsasertz eta elikagaien sustapena / Desarrollo rural, litoral y alimentario
GrupoTragsa

ADMINISTRACIONES COLABORADORAS

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
XUNTA DE GALICIA
DEPUTACIÓN DE LUGO